

DYRKNINGSNOTE

FOR

ASCLEPIAS SP.



Foto: Floradania.dk

	Asclepias physocarpa
Botanik	Familie: Asclepidaceae Hjemsted: Sydlige Africa
Formering	Frøformeres. Ved 18-20°C spirer frøene på 2-3 uger. Kan formeres ved stiklinger.
Klima	Temperatur 12-15°C Dyrkes lyst.
Vand	Planterne holdes forholdsvis tørt.
Blomstring	Hvis planten får meget vand blomstrer den først om efteråret ved en højde på ca. 2 m. Stiklingeformede planter blomstrer først 2. år.
I øvrigt	Som småplante og i ungdomsstadiet vokser planten langsomt.
Litteratur	Zechner, G. 1992: Asclepias physocarpa, die Seidenpflanze. DeGa (6):318

	Asclepias currasavica
Botanik	Familie: Asclepidaceae Hjemsted: Curacao = Suriname Dansk navn: Silkeplante
Formering	Frøformerig. Sås midt i januar i en letgødet sphagnumblanding ved 18° C. I slutningen af februar prikles i formeringsenheder, tre planter i hvert hul.
Potning	I slutningen af april pottes i en 12 cm potte
Klima	Temperatur 8-12°C. Undgå høj luftfugtighed, så luft på. Skygge: Kun for at holde temperaturen nede. Tåler let frost, -2-3°C.
Vækstregulering	Kan knibes kort efter oppotning.
Blomstring	Blomstrer fra juni til oktober.
Skadevoldere	Kan angribes af snegle, mellus, bladlus, spindemider og cikader. Virusangreb ses også.
Litteratur	Essig, W. , 1984: Weniger bekannte Topf- und Beetpflanzen unter die Lupe genommen.

Asclepias tuberosa

Botanik	Familie: Asclepidaceae Hjemsted: Østlige USA
Gødning	Gødningssammensætning i forholdet: N : P : K : Ca : Mg 100 : 24 : 144 : 37 : 20 + mikronæring