

DYRKNINGSNOTE

FOR

AJANIA PACIFICA



Foto: Floradania.dk

	<p>Ajania pacifica Syn: Chrysanthemum pacifica</p>
Botanik:	<p>Familie: Compositae Hjemsted: Japan</p>
Formering	<p>Stiklingeformeres. Stiklinger leveres primært fra marts til ultimo august. Der stikkes 1 stikling på 5 cm i en 8-10 cm potte, 3 stiklinger i en 12-14 cm potte. Ved 20-23°C roder stiklingerne på 15-18 dage. Ofte købes rodede småplanter.</p>
Potning Pladsforbrug	<p>Pottes i <u>meget</u> porøs sphagnumblanding, god afdræning. Uknebet, 9 cm: 60 pl. /m² Uknebet, 10,5 cm potte: 45 pl. /m² Knebet, 11 cm potte: 35 pl. /m² Knebet, 12 cm potte: 30 pl. /m² 13 cm potte: Højst 25 pl. /m² Det er vigtigt, at planterne får den nødvendige afstand, og til tiden, ellers får man ikke den karakteristiske kugleform.</p>
Klima	<p>Dyrkes bedst i fuld sol og ved 20-22°C, men tåler ned til 18°C, og skal da holdes forholdsvis tørt.</p>
Vækstregulering	<p>Kan knibes 1 gang. Skal ikke retarderes kemisk.</p>
Gødning	<p>Ingen oplysninger, man kan sandsynligvis bruge krysantemumgødning. Planten har ikke noget stort gødningsforbrug, men det er vigtigt at blive ved med at gødske lige til salgstidspunktet, ellers bliver bladene i bunden gule. Det samme sker, hvis planterne bliver for tørre.</p>
Blomstring	<p>Kortdagsplante. Kort dag i 9 uger giver bedst blomstring, daglængden skal være 10 timer. Kortdagsbehandlingen begyndes 2-4 uger efter oppotning. Fra november til og med februar er dagen naturlig kort. I de første par uger skal der gives dagforlængelse eller vækstlys for at planten ikke skal blive for lille.</p>
Produktionstid	<p>Uknebetne planter blomstrer 7-10 uger efter begyndelse af kort dag, knebetne planter forsinkes 1-2 uger. Rodede småplanter er salgsfærdige på 9-10 uger.</p>

Litteratur

Ann. 1996: Neuheitenschau. DeGa (29):1604.

Gildemeister, H., 1996: *Ajania pacifica*. The New Plantsman 3(2):120-121

Vissers, M., Thomas, F. 1999: *Ajania pacifica* 1+2+3
Verbondnieuws 43(19):43-45 + 43(21):4-6 +
44(1):46-47