

STANDARD DYRKNINGSVEJLEDNING

FOR

CHAMAEDOREA ELEGANS



Foto: Floradania.dk

	Chamaedorea elegans
Botanik	Familie: Palmae Hjemsted: Mexico, Guatemala
Formering	Frøformeres. Frøet bør sås friskhøstet, da spiringsevnen hurtigt aftager. Spiringshastigheden fremmes, hvis frøet lægges i støb i 48 timer i 30°C varmt vand. Sås i svagtgødet spagnum-blanding, pH 5-6. Temperatur holdes på 24-26°C i jord og luft. Spirer efter 4-6 uger.
Potning Pladsforbrug	Der pottes 6-8 planter i 8-9-10-11 cm potte i en svagtgødet spagnumblanding, pH 5,5-6,0. 8-9 cm potte: 120 pl. pr. m ² . 10 cm potte: slutafstand 30 pl. pr. m ² . Står planterne for tæt bliver der brune blade i bunden.
Klimaforhold	Temperatur: 18-20°C i luft og jord. Luft ved 22°C. Planten tåler ned til 10-12°C, men tilvæksten stopper. Skygge: Tåler ikke for meget lys, max. 25000 lux, og ikke direkte sol til små planter.
Vand Gødskning CO₂	Tåler ikke udtørring, men god afdræning er vigtig. Gødning tilføres ved hver vanding i forholdet: N : P : K : Ca : Mg 100 : 14 : 88 : 38 : 9 + mikronæring Lv 1,5-1,6, pH 5,5-6,0 i vandingsvandet Palmer er meget følsomme over for Fluor og for meget Bor. Der bør derfor ikke anvendes Superfosfat i jordblandingen, da det indeholder meget Fluor.
Planteskadegørere	Spindemider, skjoldlus, uldlus, trips, fusarium, rhizoctonia, pythium, phytophthora
Fysiogene skader	Brune bladspidser kan skyldes kalimangel eller for højt ledetal. Brune bladpletter kan skyldes for meget Fluor eller Bor.
Produktionstid	Planterne kan sælges fra 12 måneder efter såning. Efter 7 måneder er planterne 25-30 cm høje.

Litteratur	<p>Chase, A.R., Poole,R.T., 1986: Troubleshooting. Guide to foliage. Greenhouse Grower 4(11)24-25, 27.</p> <p>Hentig, W.-U.v. 1995: Chamaedorea elegans u.a. Arten. Kulturkartei Zierpflanzenbau. Paul Parey.</p> <p>Mulderij,G.E., 2000: Uw chamaedorea's blijvend groen. Valbl. Bloemist. 55(4):58-9</p>
-------------------	--