

DYRKNINGSNOTE

FOR

RUDBECKIA HIRTA



Foto: floradania.dk

	Rudbeckia hirta
Botanik	Familie: Compositae Hjemsted: Nordamerika
Sorter	Oplysninger om sorter fås ved henvendelse til småplanteleverandør.
Formering	Frøformeres. 2 g frø til 1000 planter. Sås fra februar til april. Temperatur: 18-20°C, spiringen varer 2-3 uger. Der sås i en svagtgødet spagnumblanding, pH ca. 6. Frøet kan dækkes med Vermiculite. Hvis der ikke sås i speedlingssystemer prikles der 4-5 uger efter såning.
Potning	Pottes i 10-13 cm potte, slutafstand 20-30 planter pr. m ² .
Klima	Ingen skygge. Temperatur: 16-18°C
Vand, gødning	Gødningssammensætningen kendes ikke. Lv 1,8-2,0.
Blomstring	Rudbeckia skal have 12 karakterblade, før blomsterinitieringen kan ske, ca. 60 dage efter såning. Blomsterne initieres i lang dag, over 13 timer, og ind til da gives kort dag, 11 timer. Der skal gives mindst 4 lange dage. Ved at give kort dag efter blomsterinitieringen, bliver planterne lavere end ved dyrkning i konstant lang dag. Bedste resultat fås ved at give lang dag i 8 dage, og derefter igen kort dag.
Vækstregulering	Der kan være behov for vækstregulering.
Skadegørere	Meldug Bladlus Nematoder:
Produktionstid	Fra såning til første blomst går 115-120 dage, fra start af lang dag ca. 50 dage. Så uge 5 - salg medio maj.