

Håret engtæge

[Latinsk navn](#), [Udseende](#), [Levevis og spredning](#), [Symptomer](#), [Tidspunkt](#), [Værter](#), [Forebyggelse](#), [Bekæmpelse](#), [Andre skadegørere](#)

Latinsk navn

Lygus rugulipennis

Udseende

Håret engtæge er ca. 5 mm lang og relativt bred. Farven varierer fra grågrøn til brun. Det trekantede parti på ryggen er gulligt med sorte tegninger, ofte i form af et W. Nymferne er grønne.

Levevis og spredning

Håret engtæge overvintrer som voksen i skov, hegn og markskel. De kommer frem i april, men først når lufttemperaturen er over 16-17°C, flyver de ind i markerne. Dette sker normalt fra midten af maj. Der er 1 generation om året, men overvintrede voksne kan leve langt hen på sommeren.

Tægerne har stikkende-sugende munddele. Når de optager føde, suges plantevæsker op samtidig med, at der pumpes spyt ind. Dette indeholder giftstoffer, som kan give forskellige deformiteter. Tægerne foretrækker unge, saftspændte plantedele som skudspidser, unge blade og blomsterknopper.

Symptomer

Angreb af tæger kan medføre krusede blade og hjerteløshed (blinde kål). Symptomerne er en blanding af mekanisk skade og giftvirkning af spytet. Angreb ses ofte kraftigst langs hegn. Beskyttede områder som f.eks. tiltræknings- og hærdeplads kan være meget udsatte. På små planter kan selv et ringe antal tæger gøre betydelig skade ved at ødelægge vækstpunktet på planterne. Andre tægearter kan give lignede symptomer.

Tidspunkt

Symptomer ses fra midten af maj og langt ind i juni.

Værter

Kål, gulerødder, selleri, jordbær m.fl.

Forebyggelse

Angreb af tæger kan forebygges ved at dække med fiberdug eller insektnet.

Bekæmpelse

Da angreb oftest begynder langs hegn, vil en randbehandling ofte være nok. Flere behandlinger kan være aktuelle, da indflyvningen strækker sig over en længere periode. Bekæmpes med følgende [midler](#).



Håret engtæge. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen)



"Blind blomkål. (Foto: Gitte Kjeldsen Bjørn)