

Korsblomstmeldug

[Latinsk navn](#), [Levevis og spredning](#), [Symptomer](#), [Tidspunkt](#), [Værter](#), [Forebyggelse](#), [Bekæmpelse](#), [Andre skadegrøtere](#)

Latinsk navn

Erysiphe cruciferarum

Levevis og spredning

Svampen overlever på levende planter og spredes med vinden over store afstande. 17-20°C og høj luftfugtighed fremmer udviklingen.

Symptomer

På alle overjordiske dele ses en hvid, melet belægning. Efterhånden fremkommer små, sorte prikker (kleistothecier). I broccoli kan læsionerne blive mørke ved lave temperaturer. Kinakål kan blive helt hvide på yderbladene, og rosenkål får en mørk belægning på stokken. Denne belægning kan brede sig til hovederne. Angreb er oftest kun af mindre betydning.

Tidspunkt

Oftest sidst på sommeren.

Værter

Alle korsblomstrede.

Forebyggelse

Der er sortsforskelle i modtagelighed, men der er p.t. ingen konkret viden om de dyrkede blomkål.

Bekæmpelse

Der er ingen godkendte bekæmpelsesmidler.



Meldug på hvidkål. (Foto: L. A. Hobolth).



Bladangreb af meldug. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen).