

# Lys bladplet

[Latinsk navn](#), [Levevis og spredning](#), [Symptomer](#), [Tidspunkt](#), [Værter](#), [Forebyggelse](#), [Bekæmpelse](#), [Andre skadegørere](#)

## Latinsk navn

*Cylindrosporium concentricum*

## Levevis og spredning

Svampen overlever på planterester. Sporerne spredes med vind og regnplask. Frøsmitte er påvist, men betydningen er ikke klarlagt. Ideelle vejrforhold for svampen er et fugtigt, køligt efterår, en mild, fugtig vinter og et fugtigt forår.

Svampen anses for mindre udbredt i Danmark.

## Symptomer

På bladenes over- eller underside fremkommer runde pletter med hvide, sneagtige punkter. Pletterne flyder efterhånden sammen og bliver mere brunlige og med sorte prikker. Under tørre vejrforhold ses de hvide punkter ikke særlig tydeligt. Bladribber og -stilke bliver brune og hårde, og i blomkål kan stokken blive misfarvet. Broccolihoveder kan få sorte pletter. Angrebne blade og stængler kan blive lidt deforme.

## Tidspunkt

Fra foråret og resten af vækstsæsonen.

## Værter

Korsblomstrede.

## Forebyggelse

Sædskifte og nedpløjning af planterester. Der er sortforskelle i modtagelighed, men der er p.t. ingen konkret viden om de dyrkede blomkålsorter.

## Bekæmpelse

Der er ingen godkendte bekæmpelsesmidler.



Lys bladplet på rapsblade. Betydende angreb ses sjældent i kål. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen).



Ældre angreb af lys bladplet. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen).