

DYRKNINGSNOTE

FOR

ANAGALLIS MONELLI

	Anagallis monelli
Botanik	Familie: Primulaceae Hjemsted: Vestlige Middelhavsområde.
Potning, Pladsforbrug	Der pottes 3-5 småplanter eller 1-2 stiklinger i 10-11 cm potte, eller 5-9 planter i en 13-25 cm ampel. Der pottes i en letgødet sphagnumblanding med pH 5,5-6,5. Planterne stilles med relativ god afstand, da grenene let vokser ind i hinanden, og grenene brækker let, når planterne skal skilles. Dyrkning i render er bedst.
Klima	Temperatur: Formering sker ved 18°C, senere sænkes temperaturen til 12-16°C, tåler ned til 8°C. Store planter, som er stukket om efteråret, kan med fordel overvintre ved 8-12°C. Fra marts hæves temperaturen til 12-16°C. Luft ved 16°C. Skygge: Planten er lyskrævende, så skygge kan kun komme på tale for at undgå høje temperaturer.
Vand gødning CO₂	Planterne holdes jævnt fugtige, men stående vand må undgås. Gødningssammensætningen kendes ikke.
Lys	Reagerer positivt på vækstlys, men om der er en langdags reaktion vides ikke.
Vækstregulering	Knibning: 2-6 uger efter oppotning knibes for at få en fyldig plante.
Skadegørere	Gråskimmel, bladlus
Litteratur	Ann. 1995: Anagallis monelli (Gauchheit) DeGa (35):2043