

**DYRKNINGSNOTE**

**FOR**

**TAGETES PATULA NANA**

**OG**

**TAGETES TENUIFOLIA**



*Tagetes patula. Foto: floradania.dk*

	<b>Tagetes patula nana</b>
<b>Botanik</b>	<b>Familie:</b> Compositae <b>Hjemsted:</b> Mellemerika
<b>Sorter</b>	<p>Tidligste Tagetes og med en blomsterdiameter på 40-50 mm.</p> <p><u>Enkelt-blomstrende og 15-25 cm høje sorter:</u>  <b>Pascal/Leopard/Leopold</b> - orangegul med bronze midte.  <b>Silvia</b> - guldgul.  <b>Eliza</b> - rustrød.</p> <p><u>Dobbelt-blomstrende og 20-30 cm høje sorter:</u>  <b>Bolero</b> - tofarvet rød/gul.  <b>Rusty Red</b> - rustrød.  <b>Red Cherry</b> - mørkeste tagetes. Rødbrun.</p> <p><u>Anita/Crested serie:</u>  <b>Yellow Jacket</b> - rengul.  <b>Glowing Embers</b> - rødbrun med orange rand, forbedret Honeycomb.  <b>Hero Red</b> - rødbrun med guldgul i midten.  <b>Tiger Eyes</b> - orange midte med rødbrun kant.  <b>Stardust</b> - lysegul med brune pletter.  <b>Tarca</b> - lysegul med rødbrune pletter.</p> <p><u>Boy serie (forbedring af Petite serien):</u>  <b>Golden Boy</b> - (Sunny Boy - en forbedring) guldgul.  <b>Orange Boy</b> - orange.  <b>Yellow King</b> - gul, storblomstret.</p> <p><u>Bonanza serie (en forbedring af Boy-serien i tidlighed og med større blomster).</u> Farver fra citrongul til mørk rødbrun - også tofarvede.</p> <p><u>Primo serie:</u>  <b>Apricot Brown.</b></p> <p><u>For andre/nye sorter se frøkataloger eller kontakt småplanteleverandør.</u></p>
<b>Formering</b>	<p><b>Frøformeres.</b></p> <p><u>Frøstørrelse:</u> ca. 250 frø pr. g.  <u>Frøforbrug:</u> 7,5 g. pr. 1000 planter.  <u>Såmetode:</u> Mørkespirende. Sås i kasser og dækkes med 1/2 cm såjord.  <u>Spiringsbetingelser:</u> Ved optimal temperatur 20 - 24°C tager spiringen 6 - 10 dage.</p>
<b>Potning</b>	<p><u>Priklepotning:</u> 2-3 uger efter såning i en 5-8 cm potte, box eller lignende.  <u>Slutafstand:</u> 70-110 pr m<sup>2</sup>.</p>

<b>Klimaforhold</b>	<p><u>Temperatur:</u> Efter prikling sænkes temperaturen til 16-17°C og der <u>luftes</u> ved 20-22°C. De sidste 4 uger af kulturen sænkes temperaturen til 14-15°C og der luftes ved 17-18°C. Specielt ved ringe afstand og stærkt voksende sorter, skal man passe på høje temperaturer.</p> <p><u>Lys:</u> Der skygges normalt ikke, men stærk sol kan give lysspættede blade.</p>
<b>Vand Gødning</b>	<p>Vandes jævnt, men kan tåle kraftig udtørring. Gødes ved hver vanding med en 1-1,5 promille gødningsblanding med et relativt forhold på:</p> <p style="text-align: center;">N : P : K : Ca : Mg 100 : 22 : 165 : 75 : 16 + mikronæring</p> <p>Lv 1,6-1,9. Højt ammoniumindhold bør undgås.</p>
<b>Vækstregulering</b>	<p><u>Kemisk regulering:</u> Anvendes normalt ikke.</p>
<b>Blomsterregulering</b>	<p>T. patula nana er dag- og temperaturneutral, og der foretages ingen egentlig blomstringsregulering.</p>
<b>Skadegørere</b>	<p>Gråskimmel Bladlus</p>
<b>Fysiogene skader</b>	<p>Hvidspættede blade kan skyldes høje temperaturer i forbindelse med stærk sol.</p>
<b>Kulturtid</b>	<p>8-10 uger.</p>

	<b>Tagetes tenuifolia</b>
<b>Botanik</b>	<b>Familie:</b> Compositae <b>Hjemsted:</b> Mexico
<b>Sorter</b>	En del sorter i gule, orange og rødbrune sorter. Alle sorterne er meget blomsterrige, danner små tuer og bliver 20-30 cm høje.
<b>Formering</b>	<b>Frøformeres:</b> 5 g til 1000 planter.
<b>Kultur</b>	Kultur i øvrigt som <i>Tagetes patula</i> .
<b>Blomstring</b>	Ved at kortdagsbehandle i 4 uger efter såning forkortes udviklingstiden med 3-4 uger i forhold til dyrkning i lang dag. Kort dag er her 10 timer og temperaturen er 15°C. Fra kortdagsbehandlingens start til næsten fuld blomstring går ca. 6 uger. Ved i lang dag at hæve temperaturen fra 15 til 18°C forkortes udviklingstiden med 2 uger.
<b>Litteratur</b>	Christensson, Hans, 1988: <i>Tagetes tenuifolia</i> . Fakta, Trädgård nr. 629.- Kort dag giver snabbare utveckling.