

DYRKNINGSNOTE

FOR

TRADESCANTIA SP



Foto: floradania.dk

	TRADESCANTIA SP.
Botanik	Familie: Commelinaceae Hjemsted: Tropisk og subtropisk Amerika
Formering	Stiklingeformeres. Top- eller ledstiklinger på 8-10 cm stikkes direkte i salgspotten, ca. 10 stiklinger i en 10 cm potte. Der må kun stikkes samme slags stiklinger i en potte, hvis der ønskes et ensartet slutprodukt. Stiklingerne kan tages fra typiske salgsplanter, hvis disse skal knibes. Det bedste er dog at have sortstypiske moderplanter, som udskiftes hvert år. Der stikkes i letgødet spagnumblanding, pH 5,5-6,5. Temperatur 18-20°C. Roddannelse sker på 7-10 dage.
Klimaforhold	Temperatur: 15-20°C, ældre planter tåler ned til 5°C i en kortere periode, dog ikke T. blossfeldiana og Zebrina-arter, som ofte dyrkes sammen med Tradescantia sp. Kun let skygge om sommeren, dyrkes lyst for at få gode bladtegninger.
Vand Gødning	Planterne holdes jævnt fugtige, må ikke tørre ud, men heller ikke overvandes. Lv i udvandringsvandet 1,5-1,7.
Skadegørere	<u>Svampesygdomme:</u> Pythium Bladpletsyge Gråskimmel <u>Skadedyr:</u> Spindemider Mellus Bladlus
Produktionstid	6-8 uger fra stikning.
Litteratur	Hentig, W.-U. von 1989: Tradescantia. Kulturkartei. Poul Parey