

STANDARD DYRKNINGSVEJLEDNING

FOR

SUTERA DIFFUSUS



Foto: floradania.dk

	<p>Sutera diffusus Synonym: Bacopa</p>
Botanik	<p>Familie: Scrophulariaceae Hjemsted: Sydafrika</p>
Sorter	<p>Der findes mange sorter. Blomsterfarven er blå, hvid, pink eller rosa. Der er sorter med store blomster og sorter med dobbelte blomster.</p> <p>Kontakt småplanteleverandør for oplysninger vedrørende sorter.</p>
Formering	<p>Stiklingeformeres: Ved 18-22°C roder stiklingerne på 18-12 dage. Til store ampler stikkes fra sept. til begyndelsen af dec. 3-5 stiklinger i 25 cm ampler. Fra midt i december til midt i januar stikkes 5-7 stiklinger. Til 15 cm ampler stikkes 3-4 stiklinger. I 10-12 cm potte stikkes 1 stikling fra begyndelsen af januar til begyndelsen af februar.</p> <p>Der stikkes i en sphagnumblanding med pH 5,0-6,0, højere pH medfører klorose. Dyrkningsmediet skal have en god porevolumen.</p>
Potning Pladsforbrug	<p>Hvis der er stukket i formeringsenheder, pottes samme antal planter i diverse pottestørrelser, som angivet antal stiklinger under formeringen.</p> <p>Slutafstand for 10-12 cm potter er 30-35 stk. pr. m².</p>
Klima	<p>Temperatur: I den lysfattige tid holdes 12-14°C, fra slutningen af februar holdes 14-16°C. Ved højere temperaturer bliver planterne lange og tynde. Under 12°C vokser planterne ikke.</p>
Vand Gødning CO₂	<p>Sutera må aldrig tørre ud, det bevirker at alle blomsterne falder af. Derfor må der ikke anvendes en for lille potte. Gødningen sammensættes med lige meget kalium og kvælstof. Ved for højt pH (over 6,0) opstår der let jernmangelkloroser. For meget kvælstof giver lange planter og sparsom blomstring.</p>
Vækstregulering	<p>Retardering: Normalt er retardering ikke nødvendig.</p> <p>Knibning: Når rødderne er ude ved pottetekanten kan knibes, planterne grener sig normalt godt.</p>
Blomstring	<p>Sutera ønsker alt det lys, som er muligt. Blomstringen er afhængig af lyssummen (tid x intensitet). I vinterhalvåret, og når indstrålingen er lav, fremmer det udviklingen at give 40-</p>

	<p>45 W/m², så dagen bliver 16 timer.</p> <p>En periode med lav temperatur, 5-8°C i 3-4 uger øger blomsterantallet.</p> <p>Ved høj temperatur standser blomsterdannelsen.</p>
Plantebeskyttelse	<p>Rhizoctonia</p> <p>Pythium</p> <p>Gråskimmel (Botytis)</p> <p>Bladlus</p> <p>Trips</p>
Kulturtid	<p>Store ampler: 5-8 måneder.</p> <p>Planter i 12 cm potter: 3-4 måneder.</p>
Litteratur	<p>Reimherr, P. et. al.: <i>Sutera diffusa</i> (Synonym: <i>Bacopa</i>) (Schneeflocke) 1995. DeGa (49):2841</p>