

## Cylindrocarpon

**Systematik:** Tilhører Hyphomycetes. Cylindrocarpon er den ukønnede form af Nectria sp. Fakultativ planteparasit.

**Art:** Cylindrocarpon destructans.

**Værtsplanter:** Træagtige planter, Pelargonium, Cyclamen, Asparagus, fortrinsvis i formeringsfasen.

**Symptomer og skadevirkning:** Barken på stiklingerne bliver brun fra snitfladen og opefter. Roddannelsen udebliver. Især betydning som formeringssvamp, senere sekundær.

**Forvekslingsmuligheder:** Andre "formeringssvampe" f.eks. Phytophthora og Rhizoctonia.

**Svampens udseende:** I det angrebne væv kan under fugtige forhold dannes et luftigt, hvidt, cremeagtigt mycelium.

**Sygdomsforløb:** Svampen angriber via stikkemediet plantens nedre del og roddannelse udebliver. Stiklingen bliver brun til sort (træagtige) eller klapper sammen (urteagtige).

**Smittekilder og smitteveje:** Overvintrer i jorden som mycelium og/eller konidier, og er en udpræget sårparasit. Spredes med vand.

**Hvad fremmer svampens udvikling:** Svampen er en normal jordboende saprofyt, som af og til optræder som patogen. Den trives bedst i kolde, tunge jorde med et højt saltindhold. Kan optræde som sekundær parasit efter angreb af bakterier eller Fusarium sp.

**Bekæmpelse:** Slå op i [Middeldatabasen](#), eller kontakt din konsulent.