

Sortskimmelsvamp m.fl.

[Latinsk navn](#), [Levevis og spredning](#), [Symptomer](#), [Tidspunkt](#), [Værter](#), [Forebyggelse](#), [Bekæmpelse](#), [Andre skadegrøtere](#)

Latinsk navn

Aspergillus niger (sort vandkandeskimmel), *Stemphylium botryosum* (løg-ringplet), *Penicillium spp.* (penselskimmel).

Levevis og spredning

Svampene findes overalt og optræder især på svækket plantemateriale.

Symptomer

Aspergillus er forholdsvis almindelig på lagrede løg, som er tørret ved høj temperatur. En sort pulveragtig sporebelægning ses uden på løget og mellem løgskællene. Angreb i løghalsen uden ydre symptomer forekommer også. Angrebet kan brede sig til det indre af løget som derefter kan angribes sekundært af bakterier. *Stemphylium* kan også optræde på overfladen af løg under lagring. I vækstsæsonen kan en anden art (*S. vesicarium*) også være årsag til brune bladpletter med en olivenbrun til sort sporebelægning. *Penicillium* viser sig som en grøn eller blågrøn belægning på løget under lagring eller måske allerede i marken. Angreb kan medføre råd inde i løget.

Tidspunkt

Især under lagring, men også i marken.

Værter

Aspergillus- og *Penicillium*-arter kan angribe mange forskellige planteslægter. *Stemphylium vesicarium* og *S. botryosum* angriber flere *Allium*-arter.

Forebyggelse


Undgå beskadigelse af løg. Sørg for hurtig nedtørring ved lav temperatur.

Bekæmpelse

Der er ingen godkendte midler.



Angreb af sortskimmelsvampen *Aspergillus* på lagret løg (Foto: Lars Semb, Norge).



Angreb af *Penicillium* på lagret løg - en grønlig svampebelægning ses (Foto: Ghita Cordsen Nielsen).