

# Gråskimmel

[Latinsk navn](#), [Levevis og spredning](#), [Symptomer](#), [Tidspunkt](#), [Værter](#), [Forebyggelse](#), [Bekæmpelse](#), [Andre skadegørere](#)

## Latinsk navn

*Botrytis cinerea*

## Levevis og spredning

Svampen er allesteds nærværende og angriber især planter, som er svækkede af f.eks. såring, udtørring, tip-burn eller angreb af bladlus. Under lagring kan svampen udvikle råd ved temperaturer under 0°C. I vækstsæsonen fremmer fugtighed og temperaturer på 15-20°C svampen.

## Symptomer

Gråskimmel kan findes i marken og under lagring. Angreb resulterer i et brunt, blødt råd, med en grå pels af svampemycelium med sporer. Belægningen kan også være hvid, hvis der ikke dannes sporer. I det angrebne væv kan fremkomme sorte hvileknolde (sklerotier).

## Tidspunkt

Fra fremspiring til høst, men især under lagring.

## Værter

Mange forskellige plantearter.

## Forebyggelse

Undgå at svække planterne, bl.a. ved sår- og stødskader under høst og håndtering. Sørg for en effektiv bekæmpelse af [kålbladlus](#). Hold så lav lagertemperatur som muligt og høj relativ luftfugtighed for at undgå udtørring af produkterne.

## Bekæmpelse

Der er p.t. ingen godkendte midler.



Gråskimmel på hvidkål. (Foto: L. A. Hobolth).