

# STANDARD DYRKNINGSVEJLEDNING

FOR

SCAEVOLA SALIGNA



*Foto: floradania.dk*

	<b>Scaevola saligna (Scaevola aemula)</b>
<b>Botanik</b>	<b>Familie:</b> Goodeniaceae. <b>Hjemsted:</b> Ny Kaledonien.
<b>Sorter</b>	S.s. 'Blue Wonder' (= 'Blue Fan').
<b>Formering</b>	<b>Stiklingeformeres.</b> Bedst roddannelse fås ved at anvende 5 cm lange topstiklinger. 1 stikling i en 11 cm potte, 3 stiklinger i en 20-25 cm ampel. Der bør ikke anvendes for små potter, da disse tørrer for hurtigt ud. Der stikkes i en letgødet sphagnumblanding, pH 4,0-5,5, højere pH giver langsommere vækst og klorose. Roddannelse sker på 2-3 uger ved 20°C jordtemperatur. Stiklingerne roder bedst, hvis de er taget fra vegetativt voksende moderplanter.
<b>Klimaforhold</b>	<b>Temperatur:</b> De første 3-4 uger efter oppotning holdes temperaturen på 16-18°C, derefter sænkes temperaturen til 10°C i 4 uger, og derefter 15-16°C. Under 10°C vokser planten ikke. <b>Skygge:</b> Kun skygge for at undgå for høje temperaturer.
<b>Vand Gødning CO<sub>2</sub></b>	Kræver meget vand (men god afdræning).  N : P : K : Ca : Mg 100 : 8 : 100 : 60 : 10 + mikronæring.  Lv 1,7-1,8
<b>Vækstregulering</b>	<b>Knibning:</b> Der knibes blødt 2-3 gange, ved for hård knibning bliver sideskuddene svage og uregelmæssige. Knibes over 2-4 blade. Sidste knibning 8 uger før ønsket blomstring. Der kan være behov for vækstregulering.
<b>Blomsterdannelse</b>	Blomsterdannelse kan ske ved lang dag og høj lysintensitet, men også køling giver god blomsterinduktion. Til tidlig salg sænkes temperaturen til 16°C i 4 uger, når planterne er godt i gang efter oppotning (rodning).
<b>Vækstlys</b>	Vækstlys 30-40 W pr. m <sup>2</sup> SON-T, så dagen bliver 16 timer, forkorter kulturtiden med 2-3 uger.
<b>Moderplanter</b>	Det er muligt at holde moderplanterne vegetative hele sommeren, hvis der gives kort dag, og der skygges ved kraftig indstråling.
<b>Skadegørere</b>	Pythium Verticillium: God hygiejne (forebyggende) Minerfluer (også L.trifolii)

	Trips Saintpauliatrips
<b>Holdbarhed</b>	Ikke de store transportproblemer, 3 dages transport giver ifølge det oplyste ingen skader.
<b>I øvrigt</b>	Den enkelte blomst tørrer ind og falder af, frugterne er meget små og uanselige.