

DYRKNINGSNOTE

FOR

SCHIZANTHUS WIESETONIENSIS

HYBRIDER



Foto: floradania.dk

	Schizanthus wiesetoniensis hybrider
Botanik	Familie: Solanaceae. Krydsning mellem <i>S. pinnatus</i> og <i>S. grahamii</i> . Hjemsted: Chile
Sorter	Der findes en del F ₁ -hybrider i forskellige farver. Kontakt småplanteleverandørerne for oplysninger om sorter
Formering	<u>Frøformerer.</u> 1 g. frø er 1500-2000 korn. 1200-1800 korn pr. 1000 planter (sortsafhængig). Der sås i formeringsenheder (f.eks. Multicell eller andre pløksystemer) eller i kasser. Lysspirende, dækkes derfor kun med plast. Ved 18-20°C spirer planterne på 2 uger. Er der sået i kasser, prikles efter 2-3 uger, eller der priklepottes 2-3 uger efter spiring.
Potning Pladsforbrug	Der pottes (priklepottes) i 11 cm potte i letgødet sphagnumblanding, pH 5,5-6,5. Efter oppotning: 45-50 stk. pr. m ² . Slutafstand: 20-25 planter pr. m ²
Klimaforhold	4-5 uger efter spiring sænkes temperaturen til 10-15°C. Planten dyrkes lyst, men ikke i direkte sol midt på dagen. Hvis temperaturen bliver for høj om vinteren, hvor der er for dårlige lysforhold, bliver planterne for lange. Ikke for høj luftfugtighed, d.v.s RH på 70-75%
Vand Gødning CO₂	Planterne tåler ikke for meget vand, men må heller ikke tørre ud. Ingen oplysninger om gødningssammensætning.
Vækstregulering	De nye hybrider bør ikke knibes. Der kan være behov for vækstregulering. Negativ DIF er også en mulighed, med 4°C højere nat- end dagtemperatur.
Blomstring	Schizanthus er en langdagsplante, som skal have 8 uger med mindst 13 timer dag. Kortere dag giver længere udviklingstid.
Holdbarhed	Ved stuetemperatur ca. 3 uger, ved udplantning 6-8 uger
Skadegørere	Mellus
Litteratur	Asma, H. 1993: Nederlands veredeling maakt werk von potschizanthus. Vakbl. Bloemist. (13):41. Bongartz, W. 1991: Atlantis bereichert das sortiment. GbGw (51/52): 2487-2488.