

DYRKNINGSNOTE

FOR

PLECTRANTHUS OERTENDAHLII



Foto: floradania.dk

Plectranthus oertendahlii

Botanik	Familie: Lamiaceae (Labiatae) Hjemsted: Sydafrika
Formering	Stiklingeformeres. Der kan anvendes 5-8 cm lange top- eller ledstiklinger, med 3-4 bladpar. Der kan stikkes i formeringsenheder eller direkte i salgspotten. Ved 18-22°C sker roddannelsen på 7-10 dage. Stiklingerne dækkes med plast, hvidt om sommeren, klart om vinteren. Stikkemediet et normalt gødet voksemedium.
Potning Pladsforbrug	Der pottes i 10 - 12 cm potte, eller større til store ampler. Der stikkes/pottes 3 stiklinger i 10 - 12 cm potter, 5 stiklinger i en 18 cm potte. Antal potter pr. m ² er afhængig af pottestørrelse.
Klima	<u>Temperatur:</u> Efter oppotning/formeringsfasen holdes 16-18°C. <u>Lys:</u> Planten kan vokse ved lave lysintensiteter, men så bliver stænglerne lange.
Vanding Gødskning	Der findes ingen oplysninger om vandforbrug eller gødningssammensætning.
Vækstregulering	Knibning giver en god forgrening. Ved tilstrækkeligt lys er retardering ikke nødvendig.
Blomstring	Planterne blomstrer naturligt i maj og i oktober/november.
Produktionstid	6-8 uger ved ukneben kultur, 10-14 uger ved kneben kultur.
Skadegørere	Uldlus Ingen oplysninger om sygdomme.
Litteratur	Reimherr,P. 1991: Plectranthus oertendahlii i: Neue Zierpflanzen. Ulmer.