

Kålugle

[Latinsk navn](#), [Udseende](#), [Levevis og spredning](#), [Symptomer](#), [Tidspunkt](#), [Værter](#), [Forebyggelse](#), [Bekæmpelse](#), [Andre skadegørere](#)

Latinsk navn

Mamestia brassicae

Udseende

Den voksne sommerfugl er 3 til 4 cm. Farven er rødbrun. De små larver er lysegrønne, men når de bliver ældre, varierer farven meget. De kan forblive lysegrønne eller blive gråbrune, mørkegrønne eller grå på oversiden med en smal gul stribe på siden. Gangvorter og undersiden kan variere fra grøn til gul. Undersiden er ofte lysere end oversiden.

Huden er glat med få hår. De udvoksede larver er 3-4 cm lange.

Levevis og spredning

Kåluglen, som er nataktiv, har 2 generationer pr. år. Larverne gemmer sig ofte i hjerteskuddet eller under blade o.lign. på jordoverfladen og kan derfor være svære at bekæmpe.

Symptomer

Angreb giver sig udtryk i gennemhullede blade. Larverne har forkærlighed for hjertebladene. Larverne gnaver sig ofte ind i hovederne. Ekskrementer ses tydeligt på bladene.

Tidspunkt

I perioden august og indtil frosten sætter ind.

Værter

Kål, salat, roer mv. Larverne er meget polyfage.

Forebyggelse

Ingen aktuelle muligheder.

Bekæmpelse

Der er p.t. ingen godkendte midler.



Kåluglens larve. Oversiden er ofte mørkere end undersiden (Foto: Ghita Cordsen Nielsen)



Kåluglens larve. Oversiden er ofte mørkere end undersiden (Foto: Ghita Cordsen Nielsen)



Kåluglen har forpuppet sig (Foto: Ghita Cordsen Nielsen)