

DYRKNINGSNOTE

FOR

CHLOROPHYTUM COMOSUM



Foto: Floradania.dk

| | Chlorophytum |
|--|--|
| Botanik | <p>Familie: Liliaceae</p> <p>Hjemsted: Sydafrika</p> |
| Formering | <p>Rosetterne, som dannes på udløberne bruges til formering. Rosetterne stikkes direkte i 11 cm potter eller i formerings- enheder i letgødet spagnumblanding, pH 5,5-6,5. Jordblandingen må ikke indeholde Superfosfat, da det indeholder meget Fluor, som Chlorophytum ikke tåler.</p> <p>Dækkes med plast, og ved 20-22°C sker roddannelsen på ca. 14 dage.</p> |
| Pladsforbrug | <p>Formering: 6-8 cm potte - 100-120 stk./m². Slutafstand: 10-12 cm potte - 24-30 stk./m².</p> |
| Klimaforhold | <p>Den hurtigste tilvækst sker ved 20-22°C, normalt dyrkes ved 18-20°C.</p> <p>Planterne kan tåle ned til 5-6°C uden at tage skade, væksten er da helt standset.</p> <p>Relativ luftfugtighed over 70% er med til at forhindre svedne bladspidser.</p> <p>Let skygge ved kraftig indstråling. Kan klare sig ved meget lav indstråling, men ved indstråling under 10.000 lux kommer bladene ofte til at "hænge" og danner ikke en bue.</p> |
| Vand Gødskning CO₂ | <p>Så længe planterne er unge må de ikke tørre ud. Ældre planter har dannet meget kødfulde rødder, og kan godt tåle udtørring.</p> <p>Der vandes med gødningsvand sammensat i forholdet:</p> <p>N : P : K : Ca : Mg</p> <p>100: 15 : 214: 63 : 11 + mikronæring</p> <p>Chlorophytum er meget følsom over for Bor og Fluor. Begge dele forårsager svedne bladspidser.</p> <p>Kalimangel og for kraftig udtørring kan også medføre svedne bladspidser.</p> <p>Lv. 1,3-1,6.</p> |

| | |
|--------------------------|---|
| Moderplanter | <p>Planterne danner udløberne, og på disse udløbere dannes rosetter, som anvendes til formering.</p> <p>På store planter dannes udløberne uafhængigt af daglængden, på små planter kræves kort dag, under 12 timer, 3 uger ved 8 timer giver den hurtigste udvikling.</p> <p>Moderplanterne udvælges efter stribethed</p> |
| Produktionstid | <p>Planterne kan sælges 7-8 uger efter stikning, i 8-9 cm potte, 11-12 cm potter behøver 5-6 mdr.</p> |
| Planteskadegørere | <p>Spindemider, sommerfuglelarver</p> |
| Litteratur | <p>Hentig, W.- U.v., 1991: Chlorophytum comosum u.a. Kulturkartei Zierpflanzenbau. Paul Parey.</p> <p>Sandved, G. 1983: Chlorophytum. G.Y 73:255-256</p> |