

DYRKNINGSNOTE

FOR

SENECIO MACROGLOSSUS



Foto: floradania.dk

	Senecio macroglossus
Botanik	Familie: Compositae Hjemsted: Sydafrika
Sorter	Det er i reglen S.m. 'Variegata', der dyrkes. Ifølge hollandske oplysninger stikkes 2-3 stiklinger i en 8 cm potte.
Formering	Formeres ved ledstiklinger. Stikke og voksemediet skal være porøst, for stående vand eller vandmættet potteklump tåles ikke. Optimal temperatur kendes ikke, det foreslås at prøve ved 18-20°C. Ved 12-16°C tager det 4-6 uger.
Viderekultur	En måned efter stikningen sænkes temperaturen til 12 - 16°C.
Klima	Dyrkes lyst, det giver den bedste bladtegning, men det kan blive nødvendigt at skygge for den værste sol. Vokser bedst mellem 15 og 25°C, men tåler ned til ca. 5°C. Luftfugtigheden må ikke blive for høj
Vanding	Gødningssammensætningen kendes ikke. Planten tåler en let udtørring.
Skadegørere	Angribes let af bladlus.
Produktionstid	8-10 uger efter stikning sælges planterne i en 8 cm potte. 10-11 cm potter er salgsfærdige efter 4-5 måneder ved 12-16°C.
Litteratur	Coenen,E. 1975: Mikania, geschikt voor massakultuur. Vakbl. Bloemist 30(10):26 Grüneberg,H. , 1996: Senecio mikanioides. Taspo Gartenbaumagazin 5(8):47. Röber,R. et al , 1994: Senecio macroglossus, Kapefeu. I: Topfpflanzenkulturen. Eugen Ulmer.