

	Palmer
Formering	Frøformeres. Frøene kan lægges direkte på bordet f.eks. i en grov spagnum, som holdes jævnt fugtig. Temperatur 26-28°C.
Oppotning	Der anvendes et meget porøst medium f.eks. spagnum iblandet stenuld. Potten bør være høj og slank (A-model el. planteskole). Temperaturen kan nu sænkes til 20-24°C.
Gødskning	Palmer er meget følsomme over for høje ledningsværdier, hvorfor gødningskoncentrationen i vandingsvandet bør være lav, og palmer må aldrig tørre ud. Optimalt pH er ca. 5.5. Palmer får let jern- og manganmangel, hvis pH er for højt. I det hele taget er tilstrækkelig tilførsel af mikronæringsstoffer meget vigtig. For højt fluorindhold giver bladrandssvidninger. Der tilføres gødning i forholdet: N : P : K : Ca : Mg 100: 14 : 120 : 45 : 14 + mikronæring. Lv. 1.4-1.7.
Klimaforhold	Temperatur: Marts-september: 20-22°C. Luft ved 28°C. Oktober-februar: 18-20°C. Skygge: Selv om palmer vokser på meget lysrige steder, er det ikke ensbetydende med, at den størrelse planter vi dyrker, også ønsker fuld sol året rundt. De planter vi dyrker, er meget unge planter, og disse gror normalt i skyggen af de voksne planter. Kun om vinteren bør der ikke skygges, men allerede i marts kan der være dage, hvor det er nødvendigt med skygge. Luftfugtighed: Ved høj temperatur og kraftig indstråling bør luftfugtigheden være på mindst 80%
Skadegørere	Pythium Rhizoctonia Spindemider Trips: Plantesæbe Skjold- og Uldlus