

**DYRKNINGSNOTE**

**FOR**

**CUPHEA IGNEA**

	<b>Cuphea ignea – Cigaretblomst</b>
<b>Botanik</b>	<b>Familie:</b> Lythraceae. <b>Hjemsted:</b> Mexico.
<b>Formering</b>	Frøformeres. 1 g = 600 frø. Der anvendes 2,5 g pr. 1.000 planter. Der sås fra midt i februar til slutningen af marts ved 22-25 °C. Midt i marts prikles, 18°C.
<b>Potning</b>	Midt i april pottes i en 9 cm potte.
<b>Klima</b>	Temperatur: 14-16°C. Dyrkes lyst.
<b>Væksthusregulering</b>	Cyphea ignea har en naturlig god forgrening, men stiklingeformerede og tidlige hold frøformerede planter bør knibes blødt over 4. - 5. bladpar. Der skal gives afstand til tiden – planterne løber let.
<b>Blomstring</b>	Blomstrer midt i maj.
<b>Planteskadegørere</b>	Pythium, phytophthora, spindemider
<b>Litteratur</b>	<b>Essig, W.</b> , 1984: Weniger bekannte Topf- und Beetpflanzen unter die Lupe genommen. Zierpflanzenbau (23): p. 1020-1023. <b>Wikesjö, k.</b> , 1981: Sex vakra ovanliga utplanteringsväxter: Arctoris, Cuphea, Felicia, Gazania, Lantana och Osteospermum (Dimorphothea). Trädgård 204, Alnarp.