

Kåltæge

[Latinsk navn](#), [Udseende](#), [Levevis og spredning](#), [Symptomer](#), [Tidspunkt](#), [Værter](#), [Forebyggelse](#), [Bekæmpelse](#), [Andre skadegørere](#)

Latinsk navn

Eurydema oleraceum

Udseende

Kåltægen er ca. 10 mm lang, ret bred og kraftigt bygget. Den er blågrøn, metalskinnende og med hvide eller røde pletter på bryst og vinger. Nymferne er gule og brune og er matte i farverne.

Levevis og spredning

Kåltægen overvintrer som voksen i hegn o.lign. Herfra flyver de om foråret ind i markerne og opsøger korsblomstrede planter, som de suger på. Senere lægges æg på planterne, og larverne ernærer sig ved at suge plantesaft. Der er 1 generation om året.

Kåltægen er sjælden i Danmark.

Symptomer

Angrebne blade får runde, gulgrønne pletter og bliver undertiden gennemhullede. Området er skarpt afgrænset til sundt væv. Skaderne er som regel begrænsede, idet kåltægen og deres larver ikke spredes over større afstande og derfor koncentrerer sig i nærheden af overvintringsstederne. Den enkelte plante kan dog blive helt ødelagt.

Tidspunkt

Symptomer ses fra midten af maj og ind i juli, hvor angrebene hurtigt aftager.

Værter

Kål og andre korsblomstrede planter.

Forebyggelse

Angreb af tæger kan forebygges ved at dække med fiberdug eller insektnet.

Bekæmpelse

Da angreb oftest begynder langs hegn, vil en randbehandling ofte være nok. Flere behandlinger kan være aktuelle, da indflyvningen strækker sig over en længere periode. Der er p.t. ingen godkendte midler.



Kåltægen og dens larve (nymfe). (Foto: Markens sygdomme og skadedyr, Ghita Cordsen Nielsen og Jørgen P. Jensen).