

**DYRKNINGSNOTE**

**FOR**

**LYCIANTHUS RANTONNETII**

**(SOLANUM RANTONNETII)**



*Foto: floradania.dk*

	<b>Lycianthus rantonnetii</b> <b>(Solanum rantonnetti)</b>
<b>Botanik</b>	<b>Familie:</b> Solanaceae <b>Hjemsted:</b> Paraguay og Argentina
<b>Formering</b>	Stiklingeformeres. Der anvendes topstiklinger på 4-6 cm, som ved 20°C roder på 2-3 uger.
<b>Klima</b>	<b>Temperatur</b> 15-18°C. Ved lav indstråling 15°C. Der skygges kun for at holde temperaturen nede. Planten er lyskrævende.
<b>Vand, gødning, CO<sub>2</sub></b>	Tåler ikke at tørre helt ud, men stående vand er heller ikke godt. I begge tilfælde falder bladene af. Har et højt kvælstofbehov, sandsynligvis mere kvælstof end kalium. Ved kvælstofmangel bliver de underste blade gule og falder af. Har generelt et højt vand- og gødningsforbrug
<b>Vækstregulering</b>	<b>Knibning.</b> Som potteplante i 10-11 cm knibes et par gange. Som stammet knibes 3-4 gange for at få en tæt krone.  <b>Retarding.</b> Der kan være behov for vækstregulering.
<b>Blomstring</b>	Er meget blomsterrig, hvis der er tilstrækkeligt lys, daglængden har tilsyneladende ingen indflydelse. Til tidlig blomstring første år må der gives vækstlys, og temperaturen må holdes forholdsvis høj.
<b>Plantebeskyttelse</b>	Mellus Kan angribes af en fritlevende galmitid, som ikke er artsbestemt.
<b>Produktionstid</b>	Stammede til salg i maj, stikkes juni-august.
<b>I øvrigt</b>	Er meget kraftigt voksende. Kan overvintre ved 5°C, men taber bladene, når temperaturen kommer under 8°C.