

**DYRKNINGSNOTE**

**FOR**

**BIDENS FERULIFOLIA**



*Foto: Floradania.dk*

	<b>BIDENS FERULIFOLIA</b>
<b>Botanik</b>	<b>Familie:</b> Compositae <b>Hjemsted:</b> Sydarizona til Guatemala.
<b>Sorter</b>	B.f. 'Gold Marie.' B.f. 'Samsara.' B.f. 'Golden Star' B.f. 'Peters Goldteppich'  Nyere sorter er blandt serierne Bidens Campfire®, Bidens Beedance® og Bide Dorado.
<b>Formering</b>	Stiklingeformerings. Rodning ved 20°C Efter rodning kan planterne knibes på stikkebedet.
<b>Potning Pladsforbrug</b>	Der pottes 3 småplanter i en 15-25 cm ampel, 1 plante i 10-12 cm potte. Slutafstand for 10-12 cm potter: 25-30 planter pr. m <sup>2</sup>
<b>Klima</b>	<b>Temperatur:</b> De første par uger efter oppotning holdes 18-20°C, derefter sænkes temperaturen gradvist over ca. 1 måned til 12-14°C. Ved 10-12°C bliver kulturtiden lidt længere, men planterne bliver mere kompakte. <b>Skygge:</b> Planterne er meget lyskrævende, så der skygges ikke.
<b>Vand Gødning CO<sub>2</sub></b>	Bidens er meget vand- og næringskrævende, gødningssammensætningen kendes ikke, mere kalium end kvælstof. Lv sandsynligvis 1,7 - 1,9.
<b>Vækstregulering</b>	<b>Knibning:</b> Kan knibes 1. gang på stikkebedet eller i forbindelse med oppotning. Tætte planter fås ved yderligere 1-2 knibninger, sidste gang 6-8 uger før salg. Bidens reagerer godt på 'Morgendrop' og negativ DIF, men det forlænger kulturtiden i forhold til samme dag- og nattemperatur. <b>Retardering:</b> Planterne har brug for vækstretardering.
<b>Blomstring</b>	Planten er en fakultativ langdagsplante, hvilket betyder, at hvis blomsterne skal dannes i kort dag, må temperaturen sænkes til 10-14°C.
<b>Skadegørere</b>	Gråskimmel, mellus, minerlarver Frankliniella.