

**DYRKNINGSNOTE**

**FOR**

**PODRANEA RICASOLIANA**

	<b>Podranea ricasoliana</b>
<b>Botanik</b>	<b>Familie:</b> Bignoniaceae <b>Hjemsted:</b> Sydafrika
<b>Formering</b>	<b>Stiklingeformeres.</b> Der stikkes i formeringsenheder. Ved 20°C varer roddannelsen 6-8 uger. Denne periode kan ikke forkortes ved at hæve temperaturen til 25°C og give vækstlys.
<b>Potning</b>	6-8 uger efter stikning pottes i en 11 cm potte i en gødet spagnumblanding, pH 5.5-6.5. 4-6 uger senere pottes i en 15 cm potte. Til særligt store planter kan endnu en oppotning foretages. 4 uger senere i en 21 cm potte. Ønskes en busket plante, plantes tre stiklinger sammen.
<b>Klima</b>	<b>Temperatur:</b> 18°C, luft ved 22°C.
<b>Vækstregulering</b>	Der kan der være behov for retardering. <b>Knibes</b> kraftigt ca. 3 mdr. før salg.
<b>Blomstring</b>	Blomsterdannelsen er sandsynligvis ikke daglængdeafhængig, men afhængig af indstrålingsniveau eller lyssum. Blomstrer fra juli til frost.
<b>I øvrigt</b>	Podranea er en klatreplante med lyserøde, trompetfarvede blomster. Der er rigelig langt mellem nodierne, så retardering kunne prøves. Blomstringen begynder ca. 1. juli, uanset om der er stukket i februar eller begyndelsen af april. Gødningssammensætningen kendes ikke, men planten er vand- og gødningskrævende for at blomstre godt.
<b>Litteratur</b>	Steinbacher,F., Dinkel,R., 1997: Zur kultur von Podranea. DeGa 50(41):2296-2297 Srteinbacher,F. et al., 2001: Kompakte Kübelpflanzen in Kurzkultur. DeGa 55(41):23