

DYRKNINGSNOTE

FOR

SENECIO MIKANIOIDES

	<p>Senecio mikanioides</p> <p>Jernbanevedbend</p>
Botanik	<p>Familie: Asteraceae</p> <p>Hjemsted: Sydafrika, Madagascar</p>
Formering	<p>Stiklingeformeres.</p> <p>Der stikkes 3 ledstiklinger i en 11 cm potte. En ledstikling har et blad, og stængelstykkerne er 1 cm over jorden og 2 cm under bladet. Efter rodning bryder sideknoppen.</p>
Voksemedium	<p>Porøs sphagnumblanding, pH 5,5 - 6,0. Planterne må aldrig overvandes, så der skal være en god afdræning. En let ud-tørring tåles godt.</p>
Klima	<p>Temperatur:</p> <p>15-25°C, minimum er 2-6°C.</p>
Vækstregulering	<p>Der kan være behov for vækstregulering.</p>
Blomsterdannelse	<p>Blomstrer i kort dag. Ved at mørkelægge fra 2. august til 5. september dannes blomster, som springer ud.</p> <p>Når sideskuddet er 20 cm langt begyndes kort dag, som gives i 5 uger. Er der installeret vækstlys, kan dette tændes, når indstrålingen er under 5000 lux (=45 W/m²)</p>
Udviklingshastighed	<p>Fra start af kort dag til salg går der om sommeren 10 uger, heraf 5 uger til kort dag.</p>