

**STANDARD DYRKNINGSVEJLEDNING**

**FOR**

**CODIAEUM VARIEGATUM VAR. PICTUM**



*Foto: Floradania.dk*

	<b>CODIAEUM VARIEGATUM VAR. PICTUM</b>
<b>Botanik</b>	<p><b>Familie:</b> Euphorbiaceae - Vortemælkfamilie</p> <p><b>Hjemsted:</b> Sydøstasien</p> <p>Tidligere kaldet Croton.</p>
<b>Sorter</b>	<p>Der findes mange sorter af C. var. Aktuelle sortiment kan oplyses af leverandør af stiklinger og småplanter.</p> <p><b>Kulturtid:</b></p> <p>Fra 3 mdr. (regnet fra stikkedato) ved stikning ca. 1. maj til 5 mdr., ved stikning ca. 1. september afhængig af stiklingens størrelse og af sort.</p>
<b>Formering</b>	<p>Topstiklinger med 5-7 fuldt udviklede blade. Snitfladen skal tørre let før stikning.</p> <p>Temperatur 28-30°C, efter 8 dage 24-25°C. I praksis 25°C hele tiden.</p> <p>Formering under plasttelt.</p> <p>Der stikkes direkte i salgspotte, i Jiffy 7, stenuld eller lign. formeringsmateriale.</p> <p>Roddannelse på 3-4 uger.</p> <p>Max. 120 stiklinger/m<sup>2</sup>.</p>
<b>Potning Pladsforbrug</b>	<p>Der pottes i en kalket, svagtgødet sphagnum.</p> <p>Slutafstand: 24-30 pl/m<sup>2</sup>, afhængig af sort.</p>
<b>Klima</b>	<p><b>Temperatur:</b></p> <p>25°C døgnet rundt giver den hurtigste vækst, og samtidig en god kvalitet.</p> <p>For lav jordtemperatur giver bladfald.</p> <p><b>Skygge:</b></p> <p>Kun skygge midt på dagen i meget kraftigt solskin.</p>
<b>Vand Gødskning CO<sub>2</sub></b>	<p>Ved hver vanding tilføres 0,75-1,0 promille gødning sammensat i forholdet:</p> <p>N : P : K : Ca : Mg</p> <p>100 : 12 : 160 : 85 : 19 + mikronæring</p> <p>Lv. 1,4-1,7.</p> <p>CO<sub>2</sub> m<sup>2</sup>-koncentration på indtil 800 ppm.</p>
<b>Planteskadeværere</b>	<p>Spindemider, bladlus, sørgemyggelarver, skudspidsmider, uld- og skjoldlus, pythium og phytophthora, bladpletsyge (gloeosporium), calara (thielaviopsis)</p>

<b>Moderplanter</b>	<p>Udplantede i 25 cm spande, 9 - 10 planter/m<sup>2</sup>.  Frit udplantede med 30 x 30 cm mellem planterne.  1. år kan høstes ca. 100 stiklinger/m<sup>2</sup>.  2. og følgende år 250 - 300 stiklinger/m<sup>2</sup>.  Moderplanterne anvendes 3 - 5 år.  Ca. 1/3 af arealet til moderplanter.</p>
<b>Beskrivelse af salgsplante</b>	<p>Dyrkningsvejledningen tager sigte på at levere standardvare på mindst 15 cm højde.  Dette gælder for de storbladede sorter, de småbladede lidt mindre.  I efterspurgte perioder kan planten sælges, når den er mindre, derfor kortere produktionstid.</p>
<b>Litteratur</b>	<p><b>Christensen, O. Voigt</b>, 1974: Standardiseret dyrkning af potteplanter II. Codiaeum variegatum Blume 'Geduldig'. Tids.Pl.avl 78 (2) p. 217-229 (1149 beretning)</p> <p><b>ibid</b> 1976: Produktionstidens årlige variation hos Codiaeum varietatum. Tids.Pl.avl 80 p. 140-1 beretning)</p> <p><b>ibid</b> 1976: The Seasonal Variations in Growth of Codiaeum variegatum under Greenhouse conditions.</p> <p><b>Griffioen, A.</b> 1979: Teelt van Codiaeum variegatum wordt steeds belangrijker (1) og (2). Vakblad voor de Bloemisterij 5 p. 33-36 og 6 p. 34-35.</p> <p><b>Hentig, W.- U. v. &amp; Wohanka, W.</b>, 1988: Codiaeum variegatum. Kulturkartei Zierpflanzenbau. Paul Parey.</p> <p><b>Moes, Erik</b>, 1975: Temperatur til Codiaeum variegatum Statens Forsøgsvirksomhed i Pl. kultur 1243 medd.</p>