

DYRKNINGSNOTE

FOR

PORTULACA SPP



Foto: floradania.dk

	Portulacca sp.
Botanik	Familie: Portulaccaceae Hjemsted: Argentina, Brasilien, Uruguay
Sorter	P. grandiflora: Vegetativt formerede eller frøformerede. Der findes en del frøformerede sorter i mange farver (undtagen blå), og i enkelte, halvfylde og helfylde. P. umbraticola (kun vegetativt formeret): Ca. 10 farvetoner, f.eks. Karminrød, sølvrosa, abrikos, svovlgul o.s.v. Oplysninger om sorter fås ved hen småplanteleverandør
Formering	P. umbraticola formeres vegetativt, P. grandiflora både vegetativt og generativt. Stiklingeformeres: Top- eller ledstiklinger stikkes direkte i salgspotten, 3-6 stiklinger i 13 cm ampel. Stiklingernes snitflade bør tørre 2-3 timer før der stikkes, især for at undgå svampeinfektion (Pythium). Det er vigtigt, at voksemediet har et stort luftindhold, og planterne må aldrig overvandes. Temperatur: 18-22°C, roddannelse sker da på 2-3 uger Frøformering: 1 g frø til 1000 planter med 3-5 småplanter pr. "klump". Der sås 3-10 korn direkte i 7-10 cm salgspotte eller i et pløksystem. Spiring 7-14 på 7-14 dage ved 18-20°C. Frøet skal ikke dækkes. Hvis der er lidt formeringsmateriale, kan bladstiklinger anvendes. Sårfladen tørres og bladene trykkes let til jordoverfladen, 3-4 blade i en formeringsenhed.
Potning Pladsforbrug	Pottes i en 10 cm potte i porøs, letgødet sphagnumblanding, pH 5,5-6,0. Skal planten anvendes til ampel, pottes 3 pløkke i 15-18 cm potte eller der stikkes 8-10 stiklinger direkte i salgspotten.
Klimaforhold	Temperatur: Rodning og spiring: 18-20°C. Videre vækst ved 14-18°C. Den laveste temperatur fremmer blomsterdannelsen, men forsinker plantevæksten. Lys - skygge: Så lyst som muligt.

	<p>Grandiflorum kan overvintre ved 5-10°C, men planten må ikke holdes tørt.</p>
<p>Vand Gødning CO₂</p>	<p>Da Portulaca meget let angribes af Phythium, er det vigtigt, at undgå overvanding, planterne må hellere holdes lidt for tørt.</p> <p>Der er ingen oplysninger om gødningssammensætningen.</p> <p>Lv. 1,5-1,7. - pH 5,5-6,5</p>
<p>Vækstregulering</p>	<p>Knibes 1-2 gange, første gang 1-2 uger efter potning (3-4 uger efter stikning). Portulaca grener sig i reglen godt.</p>
<p>Blomsterdannelse</p>	<p>Planter er så vidt vides daglængdeneutral, men blomsterdannelsen er afhængig af høj lyssum (indstråling x tid).</p> <p>Blomsterdannelse kan også ske ved lav temperatur, P. grandiflorum 10-12°C i 4 - 8 uger, P. umbraticola 14°C i nogen tid, væksten reduceres dog.</p>
<p>Skadegørere</p>	<p>Pythium</p> <p>Bladlus</p>
<p>Litteratur</p>	<p>Wicki-Friedl, P., 1991: Portulak-Röschen sind keine Mauerblümchen. Deut. Gart. (4) p. 212-214.</p>