

STANDARD DYRKNINGSVEJLEDNING

FOR

THUNBERGIA ALATA



Foto: floradania.dk

	THUNBERGIA ALATA
Botanik	Familie: Acanthaceae Hjemsted: Sydøst-Afrika
Sorter	Både arten og sorter dyrkes. Farverne er orange eller orange med sort øje.
Formering	<u>Frøformeres</u> Der anvendes 50 g frø til 1000 planter. Ved 18°C er spiretiden 2-3 uger.
Potning Pladsforbrug	4 uger efter såning pottes 3 planter i 12-13 cm potte, der pottes i en letgødet sphagnumblanding, pH 6,0-6,5. Slutafstand: 10-15 planter/m ² , afhængig af størrelse.
Klimaforhold	Temperatur: Ca. 8 dage efter potning kan temperaturen sænkes til 14-16°C. Skygge: Kun skygge for at holde temperaturen nede.
Vand Gødskning CO₂	Vanding: Planten må ikke tørre ud, det kan blive nødvendigt at vande 2 gange i døgnet. Den er næringskrævende, men gødningssammensætningen kendes ikke.
Blomstring	Blomsterinduktion sker i lang dag, så hvis planterne skal sælges ca. 1. april, skal der gives lys (dagforlængelse) fra oppotning.
Vækstregulering	<u>Knibning:</u> Planterne kan knibes blødt i forbindelse med potning, det giver en bedre forgrening.
Skadegørere	Rhizoctonia Spindemider Mellus Bladlus Trips
Salgsplanter	Planterne bindes til 3 stk. 60 cm bambuspinde eller bindes på bøjle. Kan også sælges som ampler.
Produktionstid	2-4 mdr., afhængig af temperaturen og indstrålingen. Såning sidst i dec. og med mulighed for vækstlys vil planterne være salgsklare midt i april. Ved såning i feb.-marts er kulturtiden godt 2 mdr.