

STANDARD DYRKNINGSVEJLEDNING

FOR

SALVIA INVOLUCRATA

	SALVIA INVOLUCRATA
Botanik	Familie: Labiatae, læbeblomstfamilien Hjemsted: Mexico og Mellemamerika
Formering	Stiklingeformerer. Der anvendes i reglen topstiklinger med 2 udviklede bladpar. Bladene bør kun være 4-6 cm lange. Moderplanten kan med fordel retarderes før stiklingerne skæres. Der stikkes under plast, 20-22°C, rodning varer ca. 2 uger.
Potning Pladsforbrug	Der stikkes direkte i 11 cm salgspotter, 3 stiklinger pr. potte. Pottetæt: 99 planter pr. m ² Afstand: 30 Planter pr. m ²
Klimaforhold	Temperatur: 18°C - luft ved 22°C. Skygge: Ingen skygge Ikke for høj relativ luftfugtighed.
Vand Gødning CO₂	Ved hver vanding tilføres 1-1,5 promille blandingsgødning. (Lv 1,6 - 1,9) sammensat i forholdet: N : P : K : Ca : Mg + mikronæring 100 : 10 : 83 : 43 : 11 Mindst 15% af kvælstoffet bør tilføres i ammoniumform.
Vækstregulering	Der kan være behov for vækstregulering. Få dage efter vækstregulering knibes over 2. bladpar.
Blomsterinduktion	S. involucrata er en kortdagsplante med kritisk daglængde på ca. 13 timer, derfor gives 12-14 nat fra midt i marts. Mørkelægningen begynder når planterne har rod og skal være minimum 6 uger, i praksis til salg.
Skadegørere	Spindemider Lus
Moderplanter	Kan overvintre ved 5-10°C. Der kan tages stiklinger ca. hver 3. uge. Dyrkes ved lang dag.
Salgsplanter	Planten skal være 25-30 cm over potteskanten med 5-6 blomsteraks.