

DYRKNINGSNOTE

FOR

RHODOCHITON

	Rhodochiton
Botanik	Familie: Schrophulariaceae Hjemsted: Mexico
Anvendelse	1- årig slyng-, potte- og ampelplante.
Formering	Frøformeres. 1500 frø til 1000 planter. Sås fra november til juni. Ved 15-20°C varer spiringen ca. 14 dage. Frøene dækkes let.
Potning Pladsforbrug	Priklepottes direkte i 9-10-12 cm potte, 6 uger efter såning, eller prikles i hulbakker, 3 x 3 cm til senere oppotning. Slutafstand: 16 pl. pr. m ² i en 12 cm potte.
Klima	Temperatur: 14-18°C, luft ved 18°C. Der skygges ved indstråling over 350 W pr. m ² .
Vand Gødning CO₂	Der gødes med en kalirig gødning: N : P : K : Ca : Mg 100 : 19 : 160 : 53 : 23 + mikronæring Lv 1,6-1,8. pH 5,5-6,0.
Vækstregulering	Der kan være behov for vækstregulering.
Blomstring	Planten er daglængdeneutral. Blomsterdannelsen og -udviklingen er lysafhængig.
Skadegørere	Mellus
Litteratur	Flathmann, B & F. Escher, 1990: Rhodochiton 'Purple Bells' - für die Hydrokultur. Gb+Gw (24): 1169-1170. Gitshow, G. & F. Escher, 1990: Rodochition 'Purple Bells' - Wachstums-regulatoren im Vergleich. Gb+Gw (24): 1171-1172.