

STANDARD DYRKNINGSVEJLEDNING

FOR

REHMANNIA ELATA

	Rehmannia elata
Botanik	Familie: Gesneriaceae Hjemsted: Kina og Japan
Formering	Frøformerig. Der sås midt i januar ved 18-20°C. I slutningen af februar prikles i pløksystemer, temperatur 16-18°C. Kan også formeres via ledstiklinger eller rodkud.
Potning	I begyndelsen af april pottes i en 10-12 cm potte
Klima	Temperatur: 10-12°C. Dyrkes lyst og køligt.
Vand/gødning	Mere kalium end kvælstof
Blomstring	For at opnå en god blomstring, skal planten køles ved 10-12°C i mindst 5 uger. Lavere temperatur forsinker blomstringen. Hvis der anvendes rodkud fra kølede planter, blomstrer planterne fra disse skud uden yderligere køling.
Retarding	Blomsterstænglerne kan retarderes.
Skadegørere	Mellus Frankliniella Gråskimmel: lav luftfugtighed.
Litteratur	Essig, W. 1984: Weniger bekannte Topf- und Beetpflanzen unter die Lupe genommen. Zierpflanzenbau (23):1020-1023. Grüneberg, H. 1994: Rehmannia elata. Taspo Gart.baumagazin (1/2): 24