

Symptomer

Duer og fasaner hakker af bladene i nyfremspirede eller på nyplantede kål. Råger kan i perioder specielt midt og sidst på sommeren gå i nyplantede kålmarker og trække planter med jordpote op for at finde insekter under disse.

Forebyggelse

Forskellige afværgemidler anvendes til at skræmme fuglene væk. Der er bedst erfaring med metoder, som kombinerer lyd og bevægelse, og det er vigtigt, at afværgemidlerne flyttes ofte - hver eller hver anden dag - for at være effektive. Blandt afværgemidler kan nævnes

- gaskanon
- Hyleren, som er elektronisk fugleskræmsel, der oppustes og falder sammen igen efter
- forudbestemt indstilling af tid
- fuglesirene, som udsender forskellige fuglelyde svarende til forskellige fugles advarselsskrik
- Peacefull pyramid, som virker ved, at en roterende pyramide udsender lysglimt. Disse skulle forvirre fuglene, så de ikke tør slå sig ned.

For bekæmpelse af råger, der optræder i flok, gælder, at de må skydes hele året i erhvervsmæssigt drevne plantager, frugthaver, frugtplantager og planteskoler. Der skal dog først søges dispensation til bekæmpelse ved vildtkonsulenten i det lokale Statsskovdistrikt.

Med tilladelse fra politiet, kan man købe nogle specielle salutpatroner, som eksploderer oppe i luften. De har en meget afskrækkende effekt.

Overdækning med fiberdug eller insektnet er en anden og kostbar metode. Til gengæld er metoden en sikker foranstaltning imod fugleskader.

Arter

Duer, fasaner, råger m.fl.



Ung blomkålsplante beskadiget af fugle.
(Foto: Frugt og Grønt Rådgivningen Jylland).