

# DYRKNINGSNOTE

FOR

DELPHINIUM SP.



*Foto: floradania.dk*

	<b>Delphinium sp.</b>
<b>Botanik</b>	<b>Familie:</b> Ranunculaceae <b>Hjemsted:</b> Sydeuropa
<b>Formering</b>	<b>Frøforming</b> , kan sås fra december til maj. Der anvendes 5-10 g frø pr. 1000 planter, afhængig af art og sort. Ved 20°C spirer frøene på 20-30 dage, ved 26°C varer spiringen 2-3 uger.
<b>Potning</b>	Prikling 4-6 uger efter såning eller der priklepottes 6-8 uger efter såning i 10 cm potte eller bokse 18-20°C.
<b>Klima</b>	Efter potning: Temperatur 5-10°C.
<b>Gødskning</b>	Delphinium har et højt gødningsbehov.
<b>Blomstring</b>	Delphinium er daglængdeneutral. På friland begynder blomstringen i slutningen af juni. I hus kan planterne blomstre i april-maj. Temperaturen holdes på 10-15°C, og der luftes ved 16-17°C for at undgå blød vækst.
<b>Skadegørere</b>	<b>Pythium:</b> Rødderne bliver glasagtige, ligner rodbrand. <b>Rhizoctonia:</b> Indsnøring af rodhalsen, evt. "spindelvæv" på jordoverfladen. <b>Phoma exiqua</b> (bladpletter): Svampen ses især i fugtigt klima og forårsager sorte pletter på blade, stængel og blomst. Misdannelser af stængel og blomster kan ses. Angrebene ses især i bunden af planterne. <b>Phyllosticta ajacis</b> (bladpletter): De sortbrune pletter er regelmæssigt runde eller ovale. De er lette at se på oversiden af bladene. De angrebne planter fjernes og brændes. <b>Meldug (Erysiphe polygoni):</b> Hvid svampebelægning på oversiden af bladene og i alvorlige tilfælde på skudspidserne. Forebyggende kan der dampes med svovl, hvis det er tilladt at anvende. <b>Kronråd (Sclerotium delphinii):</b> Planten visner og vælter pga. råd ved stængelbasis. På rødderne ses gul-brune sclerotier (hvilelegemer). <b>Bladlus</b> <b>Minerfluer</b>

	<b>Sørgemyg:</b> anvend nematoder.
<b>Produktionstid</b>	4 måneder.