

# Agerugle

[Latinsk navn](#), [Udseende](#), [Levevis og spredning](#), [Symptomer](#), [Tidspunkt](#), [Værter](#), [Bekæmpelse](#), [Andre skadegørere](#)

## Latinsk navn

*Agrotis segetum*

## Udseende

Ageruglen er en natsommerfugl, som har gråbrune, jordagtige farver på forvingerne ofte med tydelige tegninger. Vingefanget er ca. 4 cm. Larverne, som kaldes knoporme, er skinnende gråbrune med svage længdestriber. De nyklækkede larver er kun 1,5 mm lange, mens larverne i sidste larvestadium er op til 4-5 cm lange. Ved forstyrrelser ruller de sig sammen til en ring. Puppen er ca. 2½ cm lang og skinnende brun.

## Levevis og spredning

Ageruglen overvintrer som fuldt udviklet larve i jorden, hvor den forpupper sig i april-maj. Ageruglen har normalt én generation årligt, men der kan forekomme 2 flyvninger i varme somre. Andet larvehold vil dog gå tabt. Ageruglen flyver om natten i maj-juli ofte med maksimum omkring månedsskiftet juni-juli. Hunnen placerer æg på jorden eller på planterne. Æggene lægges over en lang periode fra slutningen af maj. Ægudviklingen og det første larvestadium tager ofte ca. 3 uger, men afhænger af temperaturen. I september-oktober nås sidste larvestadium.

Ageruglen har et stort værtregister og lægger også æg på ukrudtsplanter. Derfor bør arealer, der skal bruges til sen udplantning af kål, renholdes, da larverne kan gå fra ukrudtsplanterne over på den nyetablerede afgrøde.

## Symptomer

Kål er normalt ikke meget udsatte for angreb, men ved sen udplantning i en ikke-renholdt mark, kan store knoporme give anledning til stort udfald i f.eks. kinakål. Andre uglearter som kålugle (*Mamestra brassicae*) og haveugle (*Lacanobia oleracea*) kan gøre skade i kål i august-oktober ved at gnave huller i bladene og inde i hovederne.

## Tidspunkt

Fra slutningen af juni og ind i september.

## Værter

Rødbede, gulerødder, porre, kartofler, salat, kål, løg m.fl.

## Bekæmpelse

Der er p.t. ingen godkendte midler.



Angreb af ageruglens larve i sent plantet kinakål. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen)